

• Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdym lekarzowi lub dentyście

KARTE, NALEZY ZAWSZE PRZECHOWYWAĆ PRZY SOBIE

(należy zaznaczyć przepisaną dawkę)

2,5 mg 10 mg 15 mg 20 mg

Mibrex

KARTA PACJENTA

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Mibrex (rywaroksaban).

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Data urodzenia: _____ Masa ciała: _____

Inne leki i choroby: _____

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza: _____

Telefon lekarza: _____

Pieczętka lekarza: _____

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko: _____

Telefon: _____

Pokrewieństwo: _____

Informacja dla lekarza

Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Mibrex i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia lekiem Mibrex.

WERSJA 0.2_06.2023_PL

{ item-place }

Miejsce naniesienia kodu QR zawierające adres <https://www.bezpiecznaterapiapolpharma.pl/> oraz numer wewnątrz drukarni

Co należy wiedzieć o leku Mibrex?

- Lek Mibrex rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Mibrex należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy **nie należy pomijać dawki**.
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Mibrex bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mibrex należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Mibrex przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Mibrex, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Mibrex bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi okres czasu,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z dróg rodnych o większym nasileniu niż zwykle,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

Jak przyjmować lek Mibrex?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Mibrex

- 2,5 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
- 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia

15 mg trzeba przyjmować z jedzeniem

20 mg trzeba przyjmować z jedzeniem