

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Perlid, 50 mg/ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Perlid i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perlid
3. Jak stosować lek Perlid
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Perlid
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Perlid i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Perlid jest amorolfina (w postaci amorolfiny chlorowodoru), która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Działa ona grzybobójczo na różne gatunki grzybów powodujących zakażenia paznokci.

Lek Perlid jest stosowany w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perlid

Kiedy nie stosować leku Perlid

- jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Perlid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.
- Pilniczów stosowanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do zdrowych paznokci.
- W trakcie stosowania leku Perlid nie należy używać sztucznych paznokci.
- Po nałożeniu leku Perlid należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę przed nałożeniem każdego lakieru kosmetycznego. Przed ponownym nałożeniem leku Perlid lakier kosmetyczny należy ostrożnie usunąć.
- Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakiernicza, itp.) należy zakładać nieprzepuszczalne rękawice, aby chronić lek Perlid nałożony na paznokcie.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Perlid u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Perlid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Perlid z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na to, że po miejscowym zastosowaniu leku Perlid, ogólnoustrojowe narażenie na amorfina jest nieznaczne, nie przewiduje się wpływu amorfiny na ciążę oraz na noworodka lub niemowlę karmione piersią.

Nie przewiduje się wpływu leku na płodność, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na amorfina jest znikoma.

3. Jak stosować lek Perlid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Dorośli (powyżej 18 lat)

Lek Perlid należy stosować na paznokcie rąk raz lub dwa razy w tygodniu, a na paznokcie stóp raz w tygodniu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ważne jest to, żeby nie przerywać stosowania leku Perlid do momentu wyleczenia zakażenia i odrośnięcia zdrowych paznokci. Zajmuje to zwykle 6 miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i 9 do 12 miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp. Lekarz prawdopodobnie będzie kontrolował przebieg leczenia, mniej więcej co 3 miesiące.

Instrukcja użycia

1. Opiłować paznokcie



Pilniczkiem do paznokci (dołączonym do niektórych opakowań leku Perlid), należy dokładnie opiłować zakażone obszary paznokcia i całą jego powierzchnię.

UWAGA

Do zdrowych paznokci nie należy stosować pilniczków użytych do zakażonych paznokci, w przeciwnym razie można przenieść zakażenie. Aby zapobiec przeniesieniu zakażenia należy zadbać, aby nikt inny nie używał pilniczków z zestawu stosowanego do leczenia.

2. Oczyszczyć paznokcie




Wacikiem (nasączonym zmywaczem do paznokci) dołączonym do opakowania należy oczyścić powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 1 i 2 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

3. Nabrać trochę lakieru z butelki




Zanurzyć jedną ze szpatełek wielokrotnego użytku w butelce z lakierem do paznokci. Przed nałożeniem lakieru nie należy wycierać szpatełki o brzeg butelki.

4. Nałożyć lakier




Lakier należy równomiernie nanieść na całą powierzchnię paznokcia. Czynności opisane w punktach 3 i 4 należy powtórzyć na każdym zakażonym paznokciu.

5. Pozostawić do wyschnięcia



Pozostawić leczone paznokcie do wyschnięcia na około 10 minut.

6. Wyczyścić szpatełkę



Dołączone do leku szpatełki są wielokrotnego użytku. Ważne jest jednak to, żeby po każdym zabiegu leczniczym wyczyścić je dokładnie używając tego samego wacika, co do oczyszczenia paznokcia. Należy unikać dotykania wacikiem świeżo polakierowanych paznokci. Należy szczelnie zamknąć butelkę z lakierem do paznokci. Wacik należy wyrzucić zachowując ostrożność, gdyż jest on

łatwopalny.

Po nałożeniu leku Perlid należy zachować co najmniej 10 minutową przerwę przed nałożeniem każdego lakieru kosmetycznego.

Przed ponownym użyciem leku Perlid należy najpierw usunąć stary lakier, używając wacika, a następnie w razie konieczności opłukać paznokcie. Ponownie nałożyć lakier sposobem opisanym powyżej.

Woda i mydło nie wpływają na wyschnięty lakier do paznokci i dlatego można myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli konieczne jest użycie środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakiernicza, należy założyć gumowe lub inne nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić lakier na paznokciach.

Ważne

- **W razie dostania się leku Perlid do oka lub ucha, należy natychmiast wypłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.**
- **Nie dopuścić do kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej lub nosa). Nie wdychać.**

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perlid

W razie przypadkowego połknięcia lakieru przez pacjenta lub inne osoby należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Przerwanie stosowania leku Perlid

Ważne jest, żeby nie przerywać stosowania leku Perlid do momentu wyleczenia zakażenia i odrośnięcia zdrowych paznokci. W przypadku zbyt wczesnego zakończenia stosowania leku, zakażenie może pozostać niewyleczone.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

- paznokcie mogą ulec przebarwieniu, poluzować się lub zacząć oddzielać się od łożyska paznokcia,
- kruche paznokcie,
- łamliwe paznokcie.

Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- może wystąpić uczucie pieczenia w okolicy paznokcia.

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- w okolicy paznokcia może wystąpić zaczerwienienie skóry, swędzenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka lub pęcherze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: 22 49 21 301

Faks: 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Perlid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Perlid

- Substancją czynną leku jest amorolfina 50 mg/ml, w postaci amorolfiny chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (Typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan i etanol.

Jak wygląda lek Perlid i co zawiera opakowanie

Perlid to lakier do paznokci, leczniczy.

Opakowania leku:

- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami.
- butelka zawierająca 2,5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.
- butelka zawierająca 5 ml lakieru do paznokci, leczniczego z 10 szpatułkami, 30 wacikami i 30 pilniczkami do paznokci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. +48 22 364 61 01

Wytwórca

P.W. Beyvers GmbH
Schaffhausener Strasse. 26-34
D-12099 Berlin
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2022 r.